



آموزش به بیمار

داروهای بیماری های قلب و عروق



ضد انعقاد های خوراکی

معاونت درمان

مدیریت پرستاری

با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد



پلاویکس با کدام دارو ها تداخل دارد ؟

۱. مصرف همزمان با ایبوپروفن ممنوع است. (به

دلیل افزایش احتمال خونریزی)

۲. این دارو در بیماران با زخم معده و خونریزی های

داخل جمجه ای با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی پلاویکس :

سردرد، سرفه، خستگی، گیجی، اسهال، تهوع ، استفراغ

و خونریزی بینی.

نکات مورد توجه درباره قرص پلاویکس:

- ممکن است زمان خونریزی طولانی شود پس تا حد امکان از فعالیت هایی که با خطر آسیب و تصادف همراه هستند خودداری شود .
- در صورت مراجعه به دندان پزشک یا پزشک دیگر مصرف دارو را یادآور شوید .
- در صورت بروز هر گونه خونریزی غیر معمول پزشک را آگاه کنید.
- اگر قصد جراحی دارید دارو را یک هفته قبل با نظر پزشک قطع نمایید.



بیمار گرمی...

این راهنما شامل یک سری مراقبت ها و آموزش های پرستاری در رابطه با داروهای شما است که امیدواریم با رعایت آنها باعث کنترل بیماری و ارتقاء کیفیت زندگی خود گردید.

ضد انعقاد ها:

عملکرد کلی :

کاهش خطر تشکیل لخته

انواع :


۱. آسپرین (A.S.A)

۲. کلوپیدگrel (پلاویکس)

۳. وارفارین

نکات مورد توجه درباره قرص آسپرین:

- دارو را با یک لیوان آب ، شیر ، غذا یا آنتی اسید جهت کاهش تحریک معده مصرف نمائید.(البته قرص های امروزه دارای روکشی است که در روده باز میشود.)



• جهت کاهش خطر خون ریزی بهتر است مصرف A.S.A حدود یک هفته قبل از جراحی متوقف شود.

• در صورت بروز وز وز گوش ، کاهش شنوایی یا سرگیجه دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

• از مصرف داروهای بدون نسخه پزشک بخصوص داروهای سرماخوردگی و ضد احتقان بینی که ضربان قلب را افزایش می دهند خودداری نماید.

• برای جذب دهانی سریع آسپرین جویده شود.

• A.S.A در جای خشک و در دمای اتاق نگهداری شود.

• در صورتی که بیماری کلیوی یا دیابت دارید حتما با پزشک خود جهت نحوه درست مصرف دارو مشورت نمائید.



آسپرین با کدام دارو ها تداخل دارد ؟

۱. مصرف همزمان با کاپتوپریل و دیورتیک ها (ادرار آورها بخصوص اسپرونولاکتون) ممنوع است. (مسمومیت کلیوی را افزایش و سبب افزایش پتاسیم می شود).
 ۲. مصرف همزمان با کورتون ها و الکل ممنوع است .(به دلیل افزایش خونریزی معده)
- توجه:** در این مواقع با پزشک خود مشورت نمائید.

عوارض جانبی آسپرین :

ناراحتی های گوارشی خفیف نظیر تهوع ،سوء هاضمه ،استفراغ ، سرگیجه ، تاری دید