


کورتاژ چیست

از نظر پزشکی کورتاژ به معنای تراشیدن جدار داخلی رحم است و با وسیله ای بنام کورت انجام می شود در صورتی که در اثر سقط جنین مقداری از بافت جنینی در رحم تان باقی بماند پزشک به آرمی دهانه رحم را با ابزار جراحی باز می کند و سپس محتویات باقیمانده در رحم را با دستگاه مکنده یا با تراشیدن رحم خالی می کند کورتاژ ی که با دستگاه مکنده صورت پذیرد کورتاژ ساکشنی یا تخلیه مکشی نامیده می شود، و بسیار سریع تر و ایمن تر نسبت به روش سنتی است. برخی نیز از ترکیبی از دوروش استفاده می کنند.

کورتاژ چگونه انجام می شود

در هر دوروش ساکشنی و سنتی پزشک اسپکولوم را وارد مهبل می کند سپس دهانه رحم و مهبل را با یک محلول ضد عفونی کننده تمیز می نماید.



Created with

nitroPDF professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

دهانه رحم شما به دلیل دفع مقداری از بافت گشاد

می شود ولی در غیر این صورت پزشک به وسیله یک میله فلزی باریک دهانه رحم را اتساع می دهد. در بیشتر موارد پزشک به وسیله یک بی حسی موضعی دهانه رحم شما را بی حس می کند. در کورتاژ ساکشنی پزشک به وسیله وارد کردن یک لوله تو خالی از دهانه رحم شما و به طریق مکش بافت را از رحم شما خارج می سازد.

در روش سنتی پزشک به وسیله ی یک ابزار به شکل قاشق بنام کورت دیواره رحم را می تراشد. عمل کورتاژ حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول می انجامد انواع کورتاژ:

۱. تشخیصی

۲. تخلیه ای

کورتاژ تشخیصی یک روش تشخیصی درمانی است که در موارد خونریزی های غیر طبیعی زنان کاربرد دارد.

علل متعددی در ایجاد خونریزی های غیر طبیعی زنان دخیل اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

✓ نبود تعادل هورمونی
✓ پولیپ های آندومتر
✓ فیبروم های رحمی

✓ تومورهای خوش خیم رحم

✓ هیپرپلازی آندومتر

✓ رشد بیش از حد لایه داخلی رحم

✓ تومورهای بدخیم رحمی

✓ سقط روبان و جنین

✓ آموزش های قبل از عمل

✓ ۱۱- ۸ ساعت قبل از عمل چیزی نخورید، در صورت اورژانسی بودن عمل به محض اطلاع از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

✓ در صورتی که عمل شما خیلی اورژانسی نیست، قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال عفونت، استحمام کنید و لازم است موهای ناحیه ی عمل، قبل از جراحی تراشیده شود. قبل از رفتن به اتاق عمل زیور آلات، اجسام فلزی، گیره ی سر، لنز، دندان مصنوعی و غیره را خارج کنید.

✓ کلیه ی لباس ها، حتی لباس زیر و جوراب های خود را در آورید و لباس مخصوص اتاق عمل را بپوشید لاک ناخن ها و آرایش خود را پاک کنید.

✓ قبل از خروج از بخش جراحی، ادرار خود را تخلیه کنید.



بیمارستان ثامن الائمه (ع) چناران

واحد آموزش سلامت

کورتاژ

کد سند: HS/F70

تاریخ تدوین:

۱۳۹۷/۰۸/۰۲

شماره بازنگری: ۰۱

عنوان سند:

پمفلت آموزشی ویژه

بیماران

❖ ویژه اسفناج، جعفری، کلم به ویژه کلم

بروکلی، حبوبات به ویژه عدس، کشمش

سبزی (استفاده نموده و از مصرف چای و

لبنیات همراه با غذاهای پروتئینی اجتناب شود.

و به جای آن منابع ویتامین سی مانند گوجه

فرنگی، فلفل دلمه ای و مرکبات همراه با غذای

پروتئین مصرف شود.

❖ در صورت نیاز، برای جبران کم خونی خود قرص

های آهن تجویز شده توسط پزشک را به مدت

۳ ماه استفاده نمایید.

❖ ملاقات مجدد با پزشک خود داشته باشید و

جواب نمونه را به او اطلاع دهید.

در موارد زیر الزم است به پزشک خود مراجعه نمایید

تب، ترشحات زیاد و غیرطبیعی، درد زیاد در

قسمت زیر شکم، افزایش خونریزی، ترشحات

بدبو، هر نوع حالت غیر طبیعی مثل سردی، ضعف،

بی حالی و غیره

منبع: هدایت اله صالح زهی، فروش خجسته و سیما نظر

پور، پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان ۱۳۸۸.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با تلفن بیمارستان

۰۵۱۴۶۱۲۳۰۰۱ داخلی ۱۰۵ یا ۱۳۳ تماس بگیرید.

آموزش های حین عمل: عمل کورتاژ ضمن بی هوشی

عمومی یا بی حسی ناحیه ای انجام می شود و برای

دسترسی آسان به رحم شما را در وضعیت مناسبی قرار

می دهند. ابتدا دهانه ی رحم را متسع (باز) می کنند؛ در

صورتیکه علت خونریزی سقط است، محصولات حاملگی

را خارج می نمایند و اگر علت خونریزی نامعلوم است از

بافت دهانه ی رحم و رحم نمونه (بیوپسی) برمی دارند.

آموزش بعد از عمل:

❖ بعد از عمل از انجام کارهای سنگین و برداشتن

اجسام سنگین خودداری کنید.

❖ به مدت ۴ هفته از تماس جنسی خودداری

کنید.

❖ در صورتیکه عمل شما برای خارج کردن بقایای

حاملگی انجام شده، در صورت تمایل به

بارداری مجدد الزم است حاملگی خود را تا ۳

ماه به تاخیر اندازید تا رحم شما آمادگی الزم را

پیدا کند و تصمیم گیری برای بارداری مجدد

حتما تحت نظر پزشک متخصص زنان انجام

شود. ممکن است بارداری مجدد حتی دو هفته

بعد از سقط انجام گیرد. برای جلوگیری از آن

الزم است با پزشک خود مشورت نموده و روش

مناسب و مطمئنی را برای جلوگیری از بارداری

انتخاب نمایید.

❖ بعد از کورتاژ از غذاهای سرشار از آهن (

مانند: گوشت قرمز، جگر، تخم مرغ،

Created with

nitro professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional